



سؤالات آزمون نهایی درس:	ریاضیات گسسته	تعداد صفحه: ۲	رشته:	ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح
دوره دوم متوسطه - دوازدهم	تاریخ آزمون:	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳					
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.				
نمره					
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) میانگین پنج عدد طبیعی همان عدد وسطی است.</p> <p>ب) اگر $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$ آنگاه $[m^5, (m^2, m^2)] = m^5$</p> <p>ج) تفاضل هر دو عدد دلخواه از مجموعه $A = \{x \in \mathbb{Z} x = 4k + 3\}$ مضرب ۴ است.</p> <p>د) هر مجموعه احاطه گر مینیمال، یک مجموعه احاطه گر مینیمم است.</p>				
۲	<p>جاهای خالی را با اعداد مناسب تکمیل کنید.</p> <p>الف) عدد احاطه گری گراف C_7 برابر است با</p> <p>ب) تعداد راه های توزیع ۳ خودکار متفاوت بین ۵ نفر به طوری که به هر نفر حداکثر یک خودکار برسد، برابر..... است.</p>				
۳	<p>با استفاده از اثبات بازگشتی نشان دهید برای هر دو عدد حقیقی b, a داریم:</p> <p>$a^2 + b^2 \geq (a-1)(b+1)$</p>				
۴	<p>اگر a عددی طبیعی و داشته باشیم $a 7k+1$ و $a 4k+3$ ثابت کنید $a=1$ یا $a=17$.</p>				
۵	<p>اگر باقی مانده تقسیم عدد a بر دو عدد ۴ و ۵ به ترتیب ۲ و ۳ باشد، باقی مانده تقسیم عدد a را بر ۲۰ بیابید.</p>				
۶	<p>جواب های عمومی معادله سیاله $5x + 9y = 22$ را بدست آورید.</p>				
۷	<p>با توجه به گراف G مقابل به سؤالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) مرتبه و اندازه گراف را بنویسید.</p> <p>ب) مسیری به طول ۵ از راس c به راس f بنویسید.</p> <p>ج) دوری به طول ۴ بنویسید.</p> <p>د) آیا گراف \bar{G} همبند است؟ چرا؟</p>				
۸	<p>با توجه به گراف G، به سؤالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) آیا مجموعه $D = \{a, b, m\}$ یک مجموعه احاطه گر است؟ چرا؟</p> <p>ب) عدد احاطه گری گراف G را بدست آورید. (با ذکر دلیل)</p> <p>ج) یک مجموعه احاطه گر مینیمال ۵ عضوی از آن بنویسید.</p>				

ریاضیات گسسته		تعداد صفحه: ۲	رشته:	ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح
دوره دوم متوسطه - دوازدهم		تاریخ آزمون:	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایتارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳					
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.				
نمره					
۹	<p>در گراف روبرو:</p> <p>الف) مجموعه احاطه گر غیر مینیمال $A = \{b, e, g, a, f\}$ را به یک مجموعه احاطه گر مینیمال تبدیل کنید.</p> <p>ب) یک مجموعه احاطه گر مینیمم که شامل راس e باشد را بنویسید.</p> <p>ج) با اضافه نمودن چه یالی عدد احاطه گری گراف ۲ می شود؟</p> 				
۱۰	<p>الف) گراف P_7 را رسم کنید.</p> <p>ب) یک γ-مجموعه از آن را مشخص کنید.</p>				
۱۱	<p>می خواهیم ۱۰ نفر را که دو به دو برادر یکدیگرند در دو طرف طول یک میز مستطیل شکل بنشانیم. اگر بخواهیم هر نفر روبروی برادرش بنشیند، به چند طریق می توان این کار را انجام داد؟</p>				
۱۲	<p>تعداد جواب های صحیح و نامنفی معادله $x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 20$ را با شرط های $x_4 = 3, x_3 \geq 4$ ، $x_1 > 2$ به دست آورید.</p>				
۱۳	<p>با ارقام ۱، ۳، ۲، ۱، ۳، ۲، ۴، ۳، ۲، ۲ چند عدد ۱۰ رقمی می توان نوشت؟ (محاسبه جواب آخر الزامی نیست.)</p>				
۱۴	<p>قرار است سه کارگر با سه نوع ماشین نخ ریزی و سه نوع الیاف در سه روز اول هفته کار کنند. به گونه ای که هر کارگر با هر نوع ماشین و هر نوع الیاف دقیقا یک بار کار کرده باشد و نیز هر الیاف در هر ماشین دقیقا یک بار به کار گرفته شود. برای این مسئله برنامه ریزی کنید.</p>				
۱۵	<p>تعداد توابع پوشا از مجموعه A به مجموعه B عضو ۳ عضو B را بدست آورید.</p>				
۱۶	<p>حداقل چند دانش آموز در حیاط یک دبیرستان حضور داشته باشند تا مطمئن باشیم لااقل ۲۱ نفر از آنها متعلق به یک پایه تحصیلی (دهم، یازدهم، دوازدهم) و یک رشته تحصیلی (ریاضی، تجربی، انسانی) هستند؟</p>				
موفق باشید					

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس ریاضیات گسسته	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۷:۳۰	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۳ صفحه		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست (۰/۲۵) ۸ ص (ب) نادرست (۰/۲۵) ۱۷ ص (ج) درست (۰/۲۵) ۱۸ ص (د) نادرست (۰/۲۵) ۴۶ ص	۱
۲	الف) ۳ یا $\left\lceil \frac{7}{3} \right\rceil$ (۰/۲۵) ۴۹ ص (ب) ۶۰ یا $\frac{5!}{2!}$ (۰/۲۵) ۸۷ ص	۰/۵
۳	ص ۸ $a^2 + b^2 \geq ab + a - b - 1$ (۰/۲۵) $\Leftrightarrow 2a^2 + 2b^2 - 2ab - 2a + 2b + 2 \geq 0$ (۰/۲۵) $\Leftrightarrow (a-b)^2 + (a-1)^2 + (b+1)^2 \geq 0$ (۰/۷۵) این رابطه همواره برقرار است. (۰/۲۵) (در صورت اثبات یک طرفه رابطه ها و ذکر برگشت پذیر بودن آنها نمره کامل تعلق گیرد).	۱/۵
۴	ص ۱۲ $a 7k+1 \Rightarrow a 28k+4$ (۰/۲۵) $a 4k+3 \Rightarrow a 28k+21$ (۰/۲۵) $a 17(a-17)$ (۰/۲۵) $a \in \mathbb{N}$ یا $a=17$ (۰/۲۵)	۱
۵	روش اول: $a=4q_1+2$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 5a=20q_1+10$ (۰/۲۵) $a=5q_2+3$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 4a=20q_2+12$ (۰/۲۵) $\Rightarrow a=20(q_1-q_2)-2$ (۰/۲۵) $a=20q_2+18 \Rightarrow r=18$ یا $r=-2+20=18$ (۰/۲۵) روش دوم: $a \equiv 2 \pmod{4}$ $\Rightarrow a=4k+2$ (۰/۲۵) $a \equiv 3 \pmod{5}$ $\Rightarrow 4k+2 \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow 4k \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow k \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow k=5t+4$ (۰/۲۵) $\Rightarrow a=4(5t+4)+2=20t+18 \Rightarrow r=18$ (۰/۲۵) ص ۱۶	۱/۲۵
۶	روش اول: $5x \equiv 22 \pmod{25} \Rightarrow x \equiv 18 \pmod{5} \Rightarrow x=9k+8$ یا $x=9k-1$ (۰/۲۵) $\begin{cases} 5(9k+8)+9y=22 \\ 5(9k-1)+9y=22 \end{cases} \Rightarrow y=-2-5k$ یا $y=-5k+3$ (۰/۲۵) روش دوم: $9y \equiv 22 \pmod{25} \Rightarrow y \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow y=5k+3$ یا $y=5k-2$ (۰/۲۵) $\begin{cases} 5x+9(5k+3)=22 \\ 5x+9(5k-2)=22 \end{cases} \Rightarrow x=-1-9k$ یا $x=-9k+8$ (۰/۲۵) ص ۲۹	۱/۵
۷	الف) $p=7$ (۰/۲۵), $q=10$ (۰/۲۵) ب) $cebagf$ یا $ceabgf$ (۰/۵)	۲ ۳۵ ص ۳۸ ص

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس ریاضیات گسسته	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۷:۳۰	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۳/۳۱		
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۳ صفحه		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
	<p>ج) $ebgfe$ (یا هر دور به طول ۴ دیگر قابل قبول است و نمره تعلق گیرد.) (۰/۵)</p> <p>د) روش اول:</p> <p>خیر (۰/۲۵) زیرا راس e در گراف G ماکزیمم درجه است لذا درجه آن در گراف \bar{G} صفر می باشد. یا</p> <p>(۰/۲۵) \bar{G} ناهمبند است $\Rightarrow \deg_{\bar{G}}(e) = 0 \Rightarrow \deg_G(e) = p - 1 = \Delta = 6$</p> <p>روش دوم:</p> <p>گراف مکمل G رسم شود (۰/۲۵) و به ناهمبند بودن آن اشاره شود. (۰/۲۵)</p>	<p>ص ۳۸</p> <p>ص ۳۹</p>	
۸	<p>الف) خیر (۰/۲۵) زیرا راس d احاطه نمی شود. یا $N_e[a] \cup N_e[b] \cup N_e[m] \neq V(G)$ (۰/۲۵)</p> <p>ب) داریم $\gamma(G) \geq \left\lceil \frac{11}{6} \right\rceil = 2$، اما مجموعه احاطه گر دو عضوی برای این گراف وجود ندارد. پس $\gamma(G) > 2$.</p> <p>از طرفی $\{a, m, d\}$ یک مجموعه احاطه گر گراف می باشد. (۰/۲۵) پس، $\gamma(G) = 3$ (۰/۲۵)</p> <p>(به مجموعه های احاطه گر سه عضوی دیگر نیز نمره تعلق گیرد)</p> <p>ج) $\{f, g, h, i, j\}$ (۰/۵)</p>	<p>ص ۴۶</p> <p>ص ۴۹</p> <p>ص ۴۶</p>	۲
۹	<p>الف) $\{b, g, a, f\}$ (۰/۵)</p> <p>ب) $\{c, e, h\}$ (۰/۵) ص ۴۷</p> <p>ج) ec یا eh یا gf یا gc (۰/۵) ص ۴۷</p>	<p>ص ۴۷</p> <p>ص ۴۷</p>	۱/۵
۱۰	<p>الف) رسم گراف (۰/۵)</p> <p>ب) $\{v_2, v_5, v_8, v_{11}\}$ (۰/۵)</p>	 <p>ص ۵۴</p>	۱
۱۱	<p>روش اول:</p> <p>(۰/۲۵) $3840 = \underbrace{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times (2!)^5}_{(۰/۷۵)}$</p> <p>روش دوم:</p> <p>(۰/۲۵) $3840 = \underbrace{(10 \times 1) \times (8 \times 1) \times (6 \times 1) \times (4 \times 1) \times (2 \times 1)}_{(۰/۷۵)}$</p>	<p>ص ۷۱</p>	۱

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس ریاضیات گسسته	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۷:۳۰	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۳/۳۱		
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۳ صفحه		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	<p>روش اول:</p> $x_1 + 2(3) + x_r + x_f = 20 \Rightarrow x_1 + x_r + x_f = 14 \quad (0/25) \quad x_1 - 3 \geq 0 \Rightarrow x_1 = y_1 + 3, x_r - 4 \geq 0 \Rightarrow x_r = y_r + 4$ $\underbrace{y_1 + 3}_{(0/25)} + \underbrace{y_r + 4}_{(0/25)} + x_f = 14 \Rightarrow y_1 + y_r + x_f = 7 \quad (0/25) \Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 7+3-1 \\ 3-1 \end{pmatrix}}_{(0/25)} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix} = 36 \quad (0/25)$ <p>روش دوم:</p> $x_1 + x_r + x_f = 14 \quad (0/25)$ $\underbrace{\begin{pmatrix} 14-3-4+3-1 \\ 3-1 \end{pmatrix}}_{(0/25)} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix} = 36 \quad (0/25)$ <p>ص ۶۱ و ۷۱</p>	۱/۵
۱۳	<p>ص ۵۸</p> $\frac{10! \cdot (0/25)}{2! \times 3! \times 4!} \quad (0/25) \quad (0/25) \quad (0/25)$	۱
۱۴	<p>چون اعداد دو رقمی تکراری در مربع ساخته شده وجود ندارد پس متعامدند. (۰/۲۵)</p> <p>(به مربع های لاتین دیگر که ویژگی سوال را داشته باشند، نمره تعلق گیرد.)</p> <p>ص ۶۸</p>	۱/۲۵
۱۵	<p>روش اول:</p> $3^5 - \left(3 \times 3^5 - 3 \right) = 150 \quad (0/25)$ <p>روش دوم:</p> $\left. \begin{aligned} A_1 &= \{f: A \rightarrow B \mid f(a_i) \neq b_1, 1 \leq i \leq 5\} \Rightarrow A_1 = 3^5 \\ A_r &= \{f: A \rightarrow B \mid f(a_i) \neq b_r, 1 \leq i \leq 5\} \Rightarrow A_r = 3^5 \\ A_f &= \{f: A \rightarrow B \mid f(a_i) \neq b_f, 1 \leq i \leq 5\} \Rightarrow A_f = 3^5 \end{aligned} \right\} \quad (0/25)$ $ A_1 \cap A_r = A_1 \cap A_f = A_r \cap A_f = 1 \quad (0/25), A_1 \cap A_r \cap A_f = 0$ $ \overline{A_1 \cup A_r \cup A_f} = S - A_1 \cup A_r \cup A_f \quad (0/25) = 3^5 - (3 \times 3^5 - 3 \times 1) = 150 \quad (0/25)$ <p>ص ۷۷</p>	۱

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۷:۳۰	رشته: ریاضی و فیزیک	راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس ریاضیات گسسته
تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۳/۳۱	دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور وایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳		
		تعداد صفحه : ۳ صفحه	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۶	تعداد لانه : $n = 3 \times 3 = 9 \left(0/25 \right)$ $k + 1 = 21 \Rightarrow k = 20 \left(0/25 \right)$ تعداد کبوتر ها : $kn + 1 = 20 \times 9 + 1 = 181 \left(0/5 \right)$ ص ۸۳	۱
		۲۰

همکاران گرامی، خدا قوت، تمام موارد درخور اهمیت جهت نمره گذاری در راهنمای تصحیح نوشته شده است، خواهشمند است جهت رعایت عدالت آموزشی، اوراق دانش آموزان، صرفاً بر اساس راهنمای مذکور تصحیح و بازبینی شوند.

با سپاس از مساعدت همکاران بزرگوار

